

خیلی از ما این تجربه را داشته ایم که برای مشورت گرفتن درباره موضوعی یا برطرف کردن مشکل و اختلافی به مشاور یا روان شناس مراجعه کرده ایم. یک مشاور یا درمانگر خوب کسی است که رفتار درست و در چارچوب اخلاق با شما داده باشد. همچنین مایل باشد صحبت هایتان را کامل بشنود و نگرانی هایتان را درک کند. ولی اگر با خلاف این رفتارها و رفتارهای مشابه روبرو ر شوید. نشان می دهد که فرد مشورت دهنده یا درمانگر صلاحیت لازم را ندارد. در ادامه به برخی رفتارهای نادرست مشاور در اتاق مشاوره اشاره می کنیم.

- خانواده، دوستان یا همسر مرا جعه‌کننده را سرزنش می‌کند و آن‌ها را مقصر می‌داند.
- بدون اجازه یا بدون اینکه اجباری در کار باشد اطلاعات شخصی و هویت مراعاتش را بازگو می‌کند.
- زیاد صحبت می‌کند و فرصتی برای مرا جعه‌کننده نمی‌گذارد یا کم صحبت و درمان‌جو را درمانده می‌کند.
- اهمیتی به صحبت‌های مرا جعه‌کننده درباره تغییرات مهم زندگی‌اش نمی‌دهد.
- مرتب جلسه‌ها را لغو می‌کند. دیر می‌آید یا بدون اطلاع قبلی غیبت می‌کند.
- همدلی نمی‌کند یا این کار به صورت افراطی انجام می‌دهد.
- نگاه بالا به پایین دارد و طوری رفتار می‌کند که گویی برتر از مرا جعه‌کننده است.
- همه افکار، اعمال و رفتارهای مرا جعه‌کننده را زیر سؤال می‌برد و انتقاد می‌کند.
- انتقاد پذیر نیست و اشتباه‌های خود را در دوره درمان نمی‌پذیرد.
- روی یکی از اشتباه‌ها یا اختلال‌های مرا جعه‌کننده تأکید و دوره درمان را رها می‌کند.
- اصطلاحات روان‌شناسی پیچیده را به کار می‌برد و مرا جعه‌کننده را گیج می‌کند.
- مرا جعه‌کننده را از درمان مأیوس و طوری رفتار می‌کند که گویی دانشش بیش از دیگران است.
- فراموش‌کار است و نام مرا جعه‌کننده یا صحبت‌های جلسات قبلی را فراموش می‌کند.
- به صحبت‌های مرا جعه‌کننده گوش نمی‌دهد و در جلسه مشاوره، تماس‌های تلفنی‌اش را جواب می‌دهد.
- نسبت به باورهای مرا جعه‌کننده موضع متعصبانه دارد و معنویات را انکار می‌کند.
- پیش از اجرای روش‌های روان‌درمانی اجازه نمی‌گیرد و مرا جعه‌کننده را با احساسات یا خاطرات آسیب‌پذیرش روبه‌رو می‌کند.
- روش‌های درمانی دیگر روان‌شناسان و همکارانش را مسخره می‌کند.
- تضمین می‌کند که مشکلات مرا جعه‌کننده حل می‌شوند در حالی که موضوع مطلقاً در روان‌شناسی وجود ندارد.
- سعی می‌کند با مرا جعه‌کننده دوست شود و خارج از جلسه درمان با او ارتباط داشته باشد.

شخص
بار
نی

با اینکه هنوز علت دقیق ناخن جویدن مشخص نیست، مطالعات نشان می‌دهد که این رفتار ممکن است نشانه‌ای از کم‌آل گرابی، کسالت، فشار تنهائی و بلوغ باشد. با همه این‌ها بیشتر محققان براین باورند: افرادی که رفتارهای تکراری مانند ناخن جویدن دارند، کم‌آل گرا هستند و چون نمی‌توانند کاری را با سرعت متوسط به پایان برسانند و به اهداف خود برسند، ناامید، بی‌حوصله و ناراضی می‌شوند و با ناخن جویدن به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. معمولاً ناخن جویدن در دوران نوجوانی ایجاد می‌شود و بیشتر افراد هم در نهایت بدون مشکلی از آن عبور می‌کنند.

میوان
ل
ون

وجود چربی در کبد طبیعی است، ولی اگر این میزان از چربی بیش از ۵ تا ۱۰ درصد وزن کل کبد را تشکیل دهد، فرد به بیماری کبد چرب مبتلا شده است. کبد چرب به دونوع کلی دارد. کبد چرب الکلی و غیر الکلی. تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد بیش از یک سوم افراد خواب کافی ندارند و کمبود خواب با کیفیت، با افزایش وزن، افزایش خطر سنگی و کنترل نامطلوب قند خون ارتباط مستقیمی دارد و در نهایت سبب مقاومت بدن در برابر انسولین و ابتلا به کبد چرب خواهد شد. خبری که در زمان پائسه بالاتر است، چون کم‌خوابی می‌تواند سطح انسولین در این زنان را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

همراهان گرامی می‌توانید پرسش‌های خود با موضوع پزشکی، روان‌شناسی و شخصیت‌شناسی را به روش‌های زیر با ما در میان بگذارید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ آن‌ها را در همین صفحه مشاهده کنید.

پیامک: ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام رسان: ۰۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰

درباره زائده ویروسی که این روزها پزشکان درباره شیوع آن هشدار می‌دهند

مقصودم متن نژاد اگر جزو آن دسته افرادی هستی که فکر می‌کنند، تماس پوستی با حیواناتی مانند گربه و زوز غیب بروز زگیل می‌شود، قدری در اشتباهید. ویروس به نام پاپیلوما انسانی (HPV) عامل ایجاد این هرچگی‌ها یا ناخوشایند و دردسرساز است. این ویروس پیش از ۵۰ ساله متن مختلف دارد که تعداد محدودی از آن‌ها به زگیل پوست منجر می‌شود. این ویروس زمانی وارد بدن انسان می‌شود که زخم روی باز یا خراشی در سطح پوست داشته باشیم.

زگیل‌ها در هرچگی‌ای از سطح پوست می‌توانند ظاهر شوند و وقتی این هرچگی‌ای، قسمت‌ها حساسی از بدن مانند ناحیه تناسلی باشد، دیگر یک زانده‌کوچک روی اعصاب نخواهد بود و می‌تواند فرد را به درگیری جدی بیندازد و گاهی سبب مرگ او بشود. موضوعی که امروز می‌خواهیم به علت شیوع زیاد آن در جامعه با کمک گفت‌وگو منبره بزرگوار، تخصصی‌زان و زایمان آن‌را با هم بررسی و اطلاعاتمان را در این باره قدری بیشتر کنیم.

احتمال ابتلا به ویروس HPV و زگیل تناسلی در دو جنس یکسان است، ولی احتمال تبدیل شدن ویروس به سرطان در زنان بسیار بیشتر است.

زگیل تناسلی از شریک جنسی و تماس پوستی با فرد منتقل می شود و احتمال ابتلا از طریق استخر و سرویس بهداشتی نیست. از این روان را باید درد سر متأهل ها خواند و افرادی که رفتارهای پرخطر جنسی و خارج از عرف دارند.

زگیل تناسلی از شایع ترین انواع عفونت های مقاربتی با واگیر بالاست و بیشتر افرادی را که از نظر جنسی فعال اند، دست کم یک بار درگیر می کند.

زدن واکسن HPV به نام «گارداسیل» به همه خانم ها و آقایان توصیه می شود و بهتر است این کار را تا پیش از ۳۰ تا ۳۵ سالگی انجام بدهند.

زگیل تناسلی بر جستگی هایی به رنگ پوست یا سفید رنگ با ظاهری شبیه به تاج خروس یا گُل کلم است که روی همه بخش های دستگاه تناسلی بروز و ظهور پیدا می کند و می تواند به صورت تک یا خوشه ای از زگیل ها در کنار هم باشد. نشانه های زیر هم می تواند هشداری برای وجود زگیل باشد:

- خارش و سوزش یا هر نشانه ناراحت کننده دیگر
- لکه بینی و خون ریزی پس از رابطه

• درصد افرادی که مبتلا به ویروس HPV می‌شوند، نشانه ظاهری زگیل تناسلی را بروز می‌دهند، بقیه مبتلایان با وجود آلوده بودن، هیچ علامتی ندارند.



دکتر منیره پورجواد
متخصص زنان و زایمان:
زدن واکسن HPV به همه
توصیه می شود و بهتر
است این کار را تا پیش
از ۳۰ تا ۳۵ سالگی
انجام بدهند

ن متخصص زنان،
عفونی و یوست

متخصص ارولوژی،
عفونی و پوست

- افرادى که رفتارهاى پرخطر جنسى و خارج از عرف دارند.
- کسانى که یک عفو نت مقابرتى دیگر دارند.
- افرادى که سیستم ایمنى ضعیفى دارند.
- مصرف کنندگان دخانیات.

ژگیل تناسلی را می توان با رعایت بهداشت کامل، حذف منبع آلودگی و پیگیری روش های درمانی کنترل کرد. با این همه، درمان قطعی برای حذف ویروس HPV وجود ندارد و فرد باید همواره کنترل شود. برخی روش های درمانی برای از بین بردن ژگیل ها از این قرار است:

- الکترولیت کوثر یا سوزاندن با جریان الکتریکی
- سرما یا انجماد زگیل
- لیزر درمانی
- برش زگیل
- تزریق داروی اینترفرون
- یماد و اسید

از بین ۱۵۰ نوع ویروس HPV تقریبی ۳۰ نوع آن ناحیه تناسلی را تحت تأثیر قرار می دهد که از این تعداد فقط سویه ۱۱ و ۱۶ به زگیل تناسلی منجر می شود.

زگیل تناسلی شش هفته تا شش ماه پس از سرایت می تواند تظاهر بیرونی نداشته باشد و گاهی هم تا سال ها مخفی بماند.

100

- تزریق سه نوبت واکسن HPV به نام «گارداسیل» استفاده از لوازم حفاظتی در زمان برقراری رابطه
پرهیز از رابطه های پرخطر
معاینه های دوره ای
توجه: استفاده از لوازمی مانند کاندوم پیشگیرانه است ولی قطعی نیست، چون این لوازم پوشش کامل ندارند و امکان تماس پوستی وجود دارد.

- سرکہ سیب
- زرد چوبه
- روغن کرچک