



سلامت زنان چند برابر بیشتر



۵۰
میلیون

هزینه مراقبت‌های
دورهای زنان بیش از
۵۰ میلیون تومان در سال
تخمین زده می‌شود.

اختلاف
چندبرابری

در سال ۱۴۰۳ هزینه انجام تست پاپ اسمیر بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان رسید. در سال ۱۴۰۵ نیز بازه اعلام‌شده برای این تست از ۳۵۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون تومان متغیر است.

حداقل
۲
برابر

سونوگرافی رحم و تخمدان نیز از دیگر خدمات تشخیصی مورد استفاده زنان است. در سال ۱۴۰۳ هزینه این خدمت بین ۹۹۵ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. در سال ۱۴۰۴ حداقل قیمت به ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت، اما در سال ۱۴۰۵ سقف قیمت به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

افزایش
۸۳
درصدی

۸۳ درصدی: هزینه سونوگرافی واژینال نیز در این سه سال نوسان قابل توجهی داشته است. در سال ۱۴۰۳ این خدمت بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشت. در سال ۱۴۰۴ سقف قیمت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و در سال ۱۴۰۵ حداکثر هزینه به ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

هزینه
۳
برابر

ماموگرافی از مهم‌ترین روش‌های تصویربرداری برای بررسی و غربالگری سرطان پستان است. هزینه این خدمت در سال ۱۴۰۳ بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اعلام شده بود. در سال ۱۴۰۴، هزینه ماموگرافی به ۹۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان رسید و همین بازه قیمتی در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرد.

رشد
۱۴۰
درصدی

ویزیت پزشک متخصص زنان از ۱۸۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. هزینه ویزیت فوق تخصص نیز از ۲۴۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۸۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

حداقل
۳
برابر

در سال ۱۴۰۳ قیمت انواع نوار بهداشتی از ۴۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. در سال ۱۴۰۵ این بازه از ۱۰۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان متغیر است.

منهای درمان

دلایلی که زنان سراغ درمان نمی‌روند

فاصله
تا امکانات

فقر



آمارها چه می‌گویند؟

۸۱۰

در سال ۲۰۱۷ روزانه تقریباً ۸۱۰ زن به دلایل قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست دادند.

۳۱۱۰۰۰

زن در سال ۲۰۱۸ بر اثر سرطان دهانه رحم جان خود را از دست دادند.

۹۴٪

از کل مرگ و میر مادران در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد.

۴۰٪

زنان باردار دچار کم‌خونی هستند.

۷۵٪

مرگ و میر مادران به دلیل خون‌ریزی شدید (بیشتر خون‌ریزی بعد از زایمان)، عفونت (معمولاً بعد از زایمان)، فشار خون بالا در دوران بارداری (پره‌اکلامپسی و اکلامپسی)، عوارض ناشی از زایمان و سقط جنین غیرایمن است.

دردهای
بیماری‌هایی که زنان
به ارث می‌آورند

پوکی استخوان

سلامت روان

بیماری‌های
چشمی

میگرن